



Об идемпотентных τ -измеримых операторах, присоединенных к алгебре фон Неймана

А. М. Бикчентаев

Пусть τ – точный нормальный полуконечный след на алгебре фон Неймана \mathcal{M} , число $0 < p < \infty$ и $L_p(\mathcal{M}, \tau)$ – пространство интегрируемых (относительно τ) со степенью p операторов. Пусть P, Q – τ -измеримые идемпотенты и $A \equiv P - Q$. Тогда 1) если $A \geq 0$, то A – проектор и $QA = AQ = 0$; 2) если P квазинормален, то P – проектор; 3) если $Q \in \mathcal{M}$ и $A \in L_p(\mathcal{M}, \tau)$, то $A^2 \in L_p(\mathcal{M}, \tau)$.

Пусть натуральное число $n > 2$ и $A = A^n \in \mathcal{M}$. Тогда 1) если $A \neq 0$, то перестановка $\mu_t(A)$ принимает значения в множестве $\{0\} \cup [\|A^{n-2}\|^{-1}, \|A\|]$ для всех $t > 0$; 2), либо $\mu_t(A) \geq 1$ для всех $t > 0$, либо существует такое $t_0 > 0$, что $\mu_t(A) = 0$ для всех $t > t_0$. Для каждого τ -измеримого идемпотента Q существует единственный ранговый проектор $P \in \mathcal{M}$ с $QP = P$, $PQ = Q$ и $P\mathcal{M} = Q\mathcal{M}$. Существует единственное разложение $Q = P + Z$, где $Z^2 = 0$ и $ZP = 0$, $PZ = Z$. При этом если $Q \in L_p(\mathcal{M}, \tau)$, то P интегрируем и для $p = 1$ имеем $\tau(Q) = \tau(P)$. Если $A \in L_1(\mathcal{M}, \tau)$ с $A = A^3$ и $A - A^2 \in \mathcal{M}$, то $\tau(A) \in \mathbb{R}$.

Библиография: 15 названий.

Ключевые слова: гильбертово пространство, алгебра фон Неймана, нормальный след, τ -измеримый оператор, перестановка, τ -компактный оператор, интегрируемый оператор, квазинормальный оператор, идемпотент, проектор, ранговый проектор.

DOI: 10.4213/mzm11033

Введение. Пусть \mathcal{M} – алгебра фон Неймана операторов в гильбертовом пространстве \mathcal{H} , τ – точный нормальный полуконечный след на \mathcal{M} , число $0 < p < \infty$ и $L_p(\mathcal{M}, \tau)$ – пространство интегрируемых (относительно τ) со степенью p операторов. В работе получены следующие результаты об алгебраических и порядковых свойствах следа τ и элементов $*$ -алгебры $\widetilde{\mathcal{M}}$ всех τ -измеримых операторов.

Пусть $P, Q \in \widetilde{\mathcal{M}}$ – идемпотенты. Если $A \equiv P - Q \geq 0$, то A – проектор и $QA = AQ = 0$ (теорема 2.5); если P квазинормален, то P – проектор (теорема 2.10). Если $Q \in \mathcal{M}$ – идемпотент и $A \equiv P - Q \in L_p(\mathcal{M}, \tau)$, то $A^2 \in L_p(\mathcal{M}, \tau)$ (теорема 2.30). Если $A \in L_1(\mathcal{M}, \tau)$ с $A = A^3$ и $A - A^2 \in \mathcal{M}$, то $\tau(A) \in \mathbb{R}$ (следствие 2.31).

Пусть натуральное число $n > 2$. Если $A \in \mathcal{M}$ и $0 \neq A = A^n$, то перестановка $\mu_t(A)$ принимает значения в множестве $\{0\} \cup [\|A^{n-2}\|^{-1}, \|A\|]$ для всех $t > 0$ (теорема 2.13).

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект 15-41-02433) и правительством Республики Татарстан.