КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Насибуллин Рамиль Гайсаевич

НЕРАВЕНСТВА ТИПА ХАРДИ С ВЕСАМИ, ИМЕЮЩИМИ СТЕПЕННЫЕ И ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Специальность 01.01.01 — Вещественный, комплексный и функциональный анализ

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук Работа выполнена на кафедре теории функций и приближений Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Научный руководитель: доктор физико-математических наук,

профессор Авхадиев Фарит Габидинович.

Официальные оппоненты: Лосев Александр Георгиевич,

доктор физико-математических наук,

профессор ФГАОУ ВПО

«Волгоградский государственный университет»,

Тимербаев Марат Равилевич,

доктор физико-математических наук, профессор

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)

федеральный университет».

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Российский университет

дружбы народов».

Защита состоится «19» декабря 2013 г. в 16 00 на заседании диссертационного совета Д 212.081.10 при ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по адресу: 420008, Казань, ул. Кремлевская, 35.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по адресу: 420008, Казань ул. Кремлевская, 35.

Автореферат разослан «___» ноября 2013 г.

Ученый секретарь диссертационного совета Д 212.081.10 кандидат физ.-мат. наук, доцент

Е.К. Липачев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертационная работа посвящена неравенствам типа Харди. Рассматриваемые неравенства связывают в одномерном случае функцию и ее производную, а в многомерном случае — функцию и модуль ее градиента.

Актуальность темы диссертации. Помимо самостоятельного интереса, неравенства типа Харди находят важные применения в разных областях математики и математической физики. Например, С.Л. Соболев¹ использовал неравенства типа Харди в теории вложений функциональных пространств, как с весом, так и без веса, и также применял их при оценке потенциала Рисса. Ф.Г. Авхадиев нашел применение неравенствам типа Харди при оценке жесткости кручения. Соответствующие результаты А. Лаптева и Т. Вейдла, А. Балинского, А. Лаптева и А.В. Соболева могут применяться при изучении отрицательности спектра двумерного оператора Шредингера и связаны с проблемой существования резонансных состояний.

Не останавливаясь на подробностях, отметим, что неравенства типа Харди используются в теории интегральных и дифференциальных уравнений, в нелинейном анализе, при изучении краевых задач с особенностями. Точные значения констант в неравенствах Харди или их оценки используются при получении оценок нижней границы спектра эллиптических дифференциальных операторов с вырождающимися коэффициентами.

Основное неравенство Харди для абсолютно непрерывной функции f: $[0,\infty)\to\mathbb{R}$ такой, что $f(0)=0,\ f'\in L^2(0,\infty),\ f\not\equiv 0,$ можно записать следующим образом:

$$\int_{0}^{\infty} \frac{f^2}{x^2} dx < 4 \int_{0}^{\infty} f'^2 dx. \tag{1}$$

Константа 4 является точной, но не существует экстремальной функции, на которой достигается равенство.

Одномерные неравенства Харди вида (1) обобщались в различных направлениях такими авторами, как Дж. Таленти, Дж. Томаселли, Б. Макенхоупт, В.Г. Мазья, В.Д. Степанов, А. Куфнер и Л.Э. Перссон, В. Левин, Ф.Г. Авхадиев и К.-Й. Виртц, Д.В. Прохоров и ряд других математиков. Например, Дж. Таленти и Дж. Томаселли получили условия на весовые

 $^{^{1}}$ Соболев, Л.С. Избранные вопросы теории функциональных пространств и обобщенных производных / Л.С. Соболев. – М.: Наука, 1989. – 254 С.

функции в одномерных неравенствах типа Харди, которые необходимы и достаточны для выполнения соответствующего неравенства.

Широкое развитие получили неравенства типа Харди в многомерных областях следующего вида:

$$\int_{\Omega} \frac{|f|^2}{\delta^2} dx \le c_n(\Omega) \int_{\Omega} |\nabla f|^2 dx, \tag{2}$$

предполагающие, что область интегрирования Ω — собственное открытое подмножество \mathbb{R}^n , $f \in C^1_0(\Omega)$, ∇f — градиент этой функции, $\delta = \delta(x) = \mathrm{dist}(x,\partial\Omega)$ — функция расстояния до границы области.

Известно, что для любой выпуклой области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ константа $c_n(\Omega)$ в неравенстве (2) равна 4. В обосновании этого факта приняли участие ряд математиков: Е.Б. Дэвис, Т. Матскевич и П.Е. Соболевский, Х. Брезис и М. Маркус, М. Хоффманн-Остенхоф, Т. Хоффманн-Остенхоф, А. Лаптев и другие. Для области с локально липшицевой границей константа Харди существует и конечна. Однако, липшицевость границы не является необходимым условием конечности константы Харди. Доказаны неравенства типа Харди при более общих условиях на границу множества. В этом направлении работали А. Анкона, Х. Брезис и М. Маркус, Е.Б. Дэвис, П. Коскела и Х. Цонг, Й.Л. Льюис, В.Г. Мазья, В.М. Миклюков и М.К. Вуоринен, А. Ваннебо, Ф.Г. Авхадиев, А. Лаптев и А.В. Соболев, и другие математики.

При исследовании многомерных вариационных неравенств типа Харди константы являются специальными функционалами, зависящими от области Ω и числовых параметров задачи. Основной трудностью является оценка этих констант.

Пусть Ω — открытое собственное подмножество \mathbb{R}^n . Запишем функционал следующего вида:

$$c_p(s,\Omega) = \sup \left\{ \left\| \frac{f}{\delta^{s/p}} \right\|_{L^p(\Omega)} : f \in C_0^{\infty}(\Omega), \left\| \frac{\nabla f}{\delta^{s/p-1}} \right\|_{L^p(\Omega)} = 1 \right\},$$

где $C_0^\infty(\Omega)$ — множество непрерывно дифференцируемых функций с компактным носителем в Ω .

Известно, что при $p \in [1, \infty)$ и $s \in \mathbb{R}$

$$c_p(s, \mathbb{R}^n \setminus \{0\}) = \frac{p}{|s-n|}, \ c_p(s, H) = \frac{p}{|s-1|},$$

где H — полупространство в \mathbb{R}^n (см. К. Бэндл, М. Флечер, В.Г. Мазья, В. Опик, А. Куфнер). В работах Е.Б. Дэвиса, В.Г. Мазьи, М. Маркуса,

В. Мичела, Й. Пинховира рассмотрен случай, когда Ω является выпуклой областью. Оказывается, что при p>1 для любой выпуклой области $\Omega\subset\mathbb{R}^n,\Omega\neq\mathbb{R}^n$, верно равенство

$$c_p(p,\Omega) = \frac{p}{p-1}.$$

Получены также оценки $c_p(s,\Omega)$ для невыпуклых областей. А именно, если Ω — односвязная плоская область, то (А. Анкона)

$$c_2(2,\Omega) \le 4.$$

В случае, когда Ω — область с гладкой границей, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, константа

$$c_p(p,\Omega) \ge p/(p-1)$$

(см. Е.Б. Дэвис, М. Маркус, В. Мичел, Й. Пинховир).

$$p > n, \qquad s > p - \varepsilon$$

гарантируют существование конечной постоянной $c_p(s,\Omega)$ для любой области $\Omega \subset \mathbb{R}^n, \ \Omega \neq \mathbb{R}^n$. Ф.Г. Авхадиев² получил более общий результат, а именно, если s > n, то для любой открытой области $\Omega \subset \mathbb{R}^n, \ \Omega \neq \mathbb{R}^n$, верна оценка

$$c_p(s,\Omega) \le \frac{p}{s-n}.$$

Причем, в общем случае константу p/(s-n) нельзя улучшить.

Обсудим случай, когда s=n. Оказывается, что при s=n существуют области, для которых соответствующая постоянная Харди равна бесконечности, например, при любом $p\geq 1$

$$c_p(n,\mathbb{R}^n\setminus\{0\})=\infty.$$

То есть при s=n нужно накладывать некоторые дополнительные ограничения на границу множества. Из работ, относящихся к этой тематике, отметим

 $^{^2}$ Avkhadiev, F.G. $Hardy\ type\ inequalities\ in\ higher\ dimensions\ with\ explicit\ estimate\ of\ constants\ /$ F.G. Avkhadiev // Lobachevskii J. Math. -2006. - V. 21. - P. 3–31.

статьи Ф.Г. Авхадиева, А. Анконы, Х. Поммеренке, Е.Б. Дэвиса, А. Лаптева и А.В. Соболева, П. Коскела и Х. Цонг, В.М. Миклюкова и М.Р. Вуоринена, В.Г. Мазьи. Например, Ф.Г. Авхадиев, используя веса с логарифмическими особенностями, для произвольной области Ω с конечным внутренним радиусом, при $p \geq 1, s = n$ и для любой функции $f \in C_0^1(\Omega)$ получил соответствующее неравенство типа Харди. То есть логарифмический вес помогает обойти особенности, возникающие при s = n. Можно сказать, что логарифмический вес компенсирует "плохое" поведение границы области.

Как было отмечено выше, константа $p^p(s-n)^{-p}$ является точной, то есть в общем случае константу $p^p(s-n)^{-p}$ нельзя улучшить. Но обнаружено интересное явление: возможно уточнение соответствующего неравенства Харди путем добавления дополнительного слагаемого в областях с конечным внутренним радиусом. Неравенствам типа Харди с дополнительными слагаемыми посвящено множество работ. Отметим работы Х. Брезиса и М. Маркуса, М. Хоффман-Остенхоф, Т. Хоффман-Остенхофа и А. Лаптева, Ж. Тидблома, Ф.Г. Авхадиева и К.-Й. Виртца, Г. Барбатиса, С. Филиппаса и А. Тертикаса, В.Г. Мазьи и А. Тертикаса.

Цель работы. Целью работы является доказательство новых неравенств типа Харди. Исследование ведется в трех направлениях. Первое направление связано с неравенствами типа Харди в произвольных областях в терминах функции расстояния до границы области. Здесь рассматриваются два вопроса. Первый вопрос — существуют ли другие веса для которых будет выполнено соответствующее неравенство типа Харди при s=n при наличии некоторых дополнительных геометрических ограничений на область? Второй естественный вопрос — существует ли аналог неравенства в случае, когда параметр $s \in (-\infty, n)$?

Второе направление наших исследований относится к неравенствам с дополнительными слагаемыми в областях, регулярных в смысле Е.Б. Дэвиса. Доказываются неравенства с весами, имеющими степенные и логарифмические особенности. Наши результаты обобщают соответствующие утверждения Ж. Тидблома³ и результат М. Хоффман-Остенхоф, Т. Хоффман-Остенхофа, А. Лаптева⁴.

³Tidblom, J. A geometrical version of Hardy's inequality for $W_0^{1,p}(\Omega)$ / J. Tidblom // Proc. Amer. Math. Soc. – 2004. – No 132. – P. 2265–2271.

 $^{^4}$ Hoffmann-Ostenhof, M. A geometrical version of Hardy's inequality / M. Hoffmann-Ostenhof, T. Hoffmann-Ostenhof, A. Laptev // J. Funct. Anal. – 2002. – V. 189. – No. 2. – P. 539–548.

Третье направление связанно с неравенствами типа Харди в форме Ю.А. Дубинского⁵. Рассматриваются новые неравенства типа Харди с весами, содержащими модули логарифма.

Научная новизна. В диссертационной работе доказаны новые неравенства типа Харди. Особенностью полученных неравенств является наличие в весах степенных и логарифмических особенностей. Сначала мы получаем новые одномерные неравенства и распространяем их каким-нибудь известным методом на случай многомерных областей. Рассматриваем соответствующие неравенства в произвольных и выпуклых областях, в областях регулярных по Е.Б. Дэвису, во всем евклидовом пространстве \mathbb{R}^n .

Практическая и теоретическая ценность. Работа носит теоретический характер. Результаты, полученные в диссертации, могут послужить некоторым инструментом для дальнейших теоретических исследований в теории вложения функциональных пространств и в теории эллиптических дифференциальных операторов с вырождающимися коэффициентами.

Апробация работы. Результаты диссертации докладывались на итоговых научных конференциях Казанского университета (2010 — 2013 гг.), на молодежной научной школе-конференции "Лобачевские чтения — 2010" (Казань), на международных Казанских летних научных школах-конференциях "Теория функций, ее приложения и смежные вопросы" (Казань, 2011, 2013 гг.), на всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в области математических наук в рамках Всероссийского фестиваля науки (Москва, 2011 г.), на Открытом конкурсе научных работ студентов и аспирантов им. Н.И. Лобачевского (Казань, 2012 г.).

Публикации. Основные результаты опубликованы в 7 работах, список которых приведен в конце автореферата.

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 117 страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав и списка литературы из 96 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Введение содержит обоснование актуальности темы исследования с некоторыми примерами, обзор литературы по теме диссертации и краткое изложение основных результатов.

 $^{^5}$ Дубинский, Ю.А. Об одном неравенстве типа Харди и его приложениях / Ю.А. Дубинский // Тр. МИАН. – 2010. – Т. 269 – С. 112–132.

В первой главе получены неравенства типа Харди в произвольных пространственных областях из \mathbb{R}^n , но при наличии дополнительного условия:

$$\delta_0 = \delta_0(\Omega) = \sup\{\delta(x) : x \in \Omega\} < \infty.$$

Доказываются новые неравенства с весами, содержащими степени и логарифмы функции расстояния до границы области. Полученные неравенства являются аналогами неравенства из статьи $\Phi.\Gamma$. Авхадиева 2 в случае, когда параметр s < n и s = n. При s = n имеем неравенства с логарифмическими весами, а при s < n — неравенства со степенной особенностью.

В пункте 1.1.1 доказаны новые одномерные " L^1 -неравенства" с логарифмическими весами, частные случаи которых, будут использованы для получения основных результатов. L^p -версии неравенств получаем с помощью L^p -леммы:

Лемма 1.1.5. Предположим, что Ω является открытым множеством $n \geq 1, w_1 = w_1(x) > 0, w_2 = w_2(x) \geq 0$ на Ω и $J: C_0^1(\Omega) \to \mathbb{R}$ — некоторый функционал. Если для любой функции $f \in C_0^1(\Omega)$

$$J(f) + \int_{\Omega} |f| w_1 dx \le c \int_{\Omega} |\nabla f| w_2 dx, \quad c = const > 0,$$

то для любого $p\in (1,\infty),$ для любого $l\in [1,p]$ и для любой функции $f\in C^1_0(\Omega)$

$$lJ(|f|^p) + \int_{\Omega} |f|^p w_1 dx \le (cp)^l \int_{\Omega} |f|^{p-l} |\nabla f|^l w_1^{1-l} w_2^l dx.$$

Пункт 1.1.2 посвящен пространственным случаям неравенств.

Для целых $k \geq 0$ положим

$$e_0 = 1$$
, $e_{k+1} = \exp e_k$, $\ln_0 x = x$, $\ln_{k+1}(x) = \ln \ln_k(x)$.

Отметим, что корректная определенность области определения функции \ln_k при соответствующем k достигается за счет e_k .

Пусть Ω — открытое собственное подмножество \mathbb{R}^n , $C_0^1(\Omega)$ — семейство непрерывно-дифференцируемых функций с компактным носителем в Ω и $\delta = \delta(x) = \mathrm{dist}(x,\partial\Omega)$ — функция расстояния до границы области.

Основные результаты параграфа §1.1 приведены в следующих четырех теоремах.

Теорема 1.1.5. Пусть Ω — произвольное открытое множество в \mathbb{R}^n , причем $\Omega \neq \mathbb{R}^n$, $\delta_0(\Omega) < \infty$, и пусть $k \in \mathbb{N}$ и $p \in [1, \infty)$. Если $l \in [1, p]$, то

для любой функции $f \in C_0^1(\Omega)$ верно следующее неравенство типа Xарди

$$\int_{\Omega} \frac{|f|^p}{\delta^n} \mathcal{A}(\delta) dx \le A_{p,l}(\Omega) \int_{\Omega} \frac{|f|^{p-l} |\nabla f|^l}{\delta^{n-l}} \mathcal{B}(\delta) dx, \tag{3}$$

где

$$\mathcal{A}(\delta) = \frac{1}{\ln \frac{\delta_0 e_k}{\delta} \cdot \ldots \cdot \ln_k \frac{\delta_0 e_k}{\delta}}$$

u

$$\mathcal{B}(\delta) = \left(\ln \frac{\delta_0 e_k}{\delta} \cdot \ldots \cdot \ln_k \frac{\delta_0 e_k}{\delta}\right)^{l-1} \left(\ln_{k+1} \frac{\delta_0 e_k}{\delta}\right)^l,$$

причем точная, т.е наименьшая из возможных постоянных $A_{p,l}(\Omega)$ в этом неравенстве допускает оценку

$$A_{p,l}(\Omega) \le p^l$$
.

Теорема 1.1.6. Пусть $k \in \mathbb{N}$ и $p \in [1, \infty)$. Если $l \in [1, p]$ и $\beta \in (1, \infty)$, то для произвольного открытого множества Ω из \mathbb{R}^n ($\Omega \neq \mathbb{R}^n$, $\delta_0(\Omega) < \infty$) и для любой функции $f \in C_0^1(\Omega)$ верно неравенство

$$\int_{\Omega} \frac{|f|^p}{\delta^n} \mathcal{C}(\delta) dx \le D_{p,l}(\beta, \Omega) \int_{\Omega} \frac{|f|^{p-l} |\nabla f|^l}{\delta^{n-l}} \mathcal{D}(\delta) dx,$$

e

$$C(\delta) = \frac{1}{\ln \frac{\delta_0 e_{k+1}}{\delta} \cdot \ldots \cdot \ln_k \frac{\delta_0 e_{k+1}}{\delta} \left(\ln_{k+1} \frac{\delta_0 e_{k+1}}{\delta} \right)^{\beta}}$$

u

$$\mathcal{D}(\delta) = \left(\ln \frac{\delta_0 e_{k+1}}{\delta} \cdot \ldots \cdot \ln_k \frac{\delta_0 e_{k+1}}{\delta}\right)^{l-1} \left(\ln_{k+1} \frac{\delta_0 e_{k+1}}{\delta}\right)^{\beta(l-1)},$$

причем наименьшая из возможных констант в этом неравенстве $D_{p,l}(\beta,\Omega)$ допускает оценку

$$D_{p,l}(\beta,\Omega) \le \left(\frac{p}{\beta-1}\right)^l.$$

Теорема 1.1.7. Пусть $k \in \mathbb{N}$ и $p \in [1, \infty)$. Если $l \in [1, p]$ и $\beta \in (0, 1)$, то для произвольного открытого множества Ω из \mathbb{R}^n ($\Omega \neq \mathbb{R}^n$, $\delta_0(\Omega) < \infty$) и для любой функции $f \in C_0^1(\Omega)$ верна оценка

$$\int_{\Omega} \frac{|f|^p}{\delta^n} \mathcal{E}(\delta) dx \le H_{p,l}(\beta, \Omega) \int_{\Omega} \frac{|f|^{p-l} |\nabla f|^l}{\delta^{n-l}} \mathcal{F}(\delta) dx,$$

где

$$\mathcal{E}(\delta) = \frac{1}{\ln \frac{\delta_0 e_k}{\delta} \cdot \ldots \cdot \ln_k \frac{\delta_0 e_k}{\delta} \left(\ln_{k+1} \frac{\delta_0 e_k}{\delta} \right)^{\beta}}$$

u

$$\mathcal{F}(\delta) = \left(\ln \frac{\delta_0 e_k}{\delta} \cdot \ldots \cdot \ln_k \frac{\delta_0 e_k}{\delta}\right)^{l-1} \left(\ln_{k+1} \frac{\delta_0 e_k}{\delta}\right)^{l-\beta},\,$$

причем для точной константы $H_{p,l}(\beta,\Omega)$ верно следующее неравенство

$$H_{p,l}(\beta,\Omega) \le \left(\frac{p}{1-\beta}\right)^l.$$

Теорема 1.1.8. Пусть $p \in [1, \infty)$ и $l \in [1, p]$. Если $r \in (1, \infty)$ и $q \in (0, 1)$, то для произвольного открытого множества Ω из \mathbb{R}^n ($\Omega \neq \mathbb{R}^n$, $\delta_0(\Omega) < \infty$) и для любой функции $f \in C_0^1(\Omega)$ имеет место следующее неравенство

$$\int\limits_{\Omega} \frac{|f|^p}{\delta^n} \mathcal{G}(\delta) dx \leq \frac{p^l \left(\Gamma(1-q)\right)^l}{(r-1)^{l(1-q)}} \int\limits_{\Omega} \frac{|f|^{p-l} |\nabla f|^l}{\delta^{n-l}} \mathcal{H}(\delta) dx,$$

 $e \partial e$

$$\mathcal{G}(\delta) = \frac{1}{\left(\ln \frac{\delta_0 e_2}{\delta}\right)^r \left(\ln \ln \frac{\delta_0 e_2}{\delta}\right)^q}$$

u

$$\mathcal{H}(\delta) = \left(\ln \frac{\delta_0 e_2}{\delta}\right)^{r(l-1)} \left(\ln \ln \frac{\delta_0 e_2}{\delta}\right)^{q(l-1)}.$$

Цель параграфа §1.2 — показать, что константы в теоремах 1.1.5, 1.1.6 при l=1 и 1.1.7 в общем случае нельзя заменить меньшими постоянными, то есть существуют экстремальные области Ω_0 , Ω_1 и Ω_2 для которых соответственно выполнены равенства

$$A_{p,l}(\Omega_0) = p^l, \ D_{p,1}(\beta, \Omega_1) = \frac{p}{\beta - 1}, \ H_{p,l}(\beta, \Omega_2) = \left(\frac{p}{1 - \beta}\right)^l.$$

А именно, доказывается, что для любого $\varepsilon_0 > 0$ существуют область Ω_0 и функция из пространства $C_0^1(\Omega_0)$ такие, что соответствующее неравенство (3) не будет выполнено при замене p^l на $p^l - \varepsilon_0$. Аналогичное утверждение покажем для константы $D_{p,1}(\beta,\Omega)$ и константы $H_{p,l}(\beta,\Omega)$. Отметим, что неравенство теоремы 1.1.6 при l=1 является точным для шара с проколотым центром.

В параграфе §1.3 рассматриваются новые весовые неравенства в произвольных открытых множествах, содержащие степенные особенности,

и приводятся аналоги этих неравенств для выпуклых областей. Отметим, что степенные " L^1 -неравенства" в выпуклых областях являются точными.

Для произвольной открытой области имеет место

Теорема 1.3.2. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — произвольное открытое множество с конечным внутренним радиусом $\delta_0(\Omega)$, причем $n \geq 1$, $\delta := dist(x, \partial\Omega)$. Если $1 \leq p < \infty, \ l \in [1,p] \ u - \infty < s < n, \ mo$

$$\int_{\Omega} \frac{|f|^p}{\delta^s} dx \le \left(\frac{p\delta_0^{n-s}}{n-s}\right)^l \int_{\Omega} \frac{|f|^{p-l} |\nabla f|^l}{\delta^{s+l(n-1-s)}} dx.$$

В случае выпуклых областей справедлива

Теорема 1.3.3. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — открытое множество, компоненты которого являются выпуклыми множествами, с конечным внутренним радиусом $\delta_0(\Omega)$, и пусть $\delta := dist(x, \partial\Omega)$. Если $1 \leq p < \infty$ и $-\infty < s < 1$, то

$$\int_{\Omega} \frac{|f|^p}{\delta^s} dx \le \left(\frac{p}{1-s}\right)^p \delta_0(\Omega)^{p(1-s)} \int_{\Omega} \frac{|\nabla f|^p}{\delta^{s-sp}} dx \quad \forall f \in C_0^1(\Omega).$$

Во второй главе получены новые весовые неравенства типа Харди в областях регулярных по Е.Б. Дэвису. Сначала доказываются неравенства в произвольных областях, далее показывается, что неравенства принимают существенно простой вид в выпуклых областях и в областях с регулярной границей.

Доказанные в этой главе неравенства со степенными весами являются аналогами соответствующих результатов М. Хоффман-Остенхоф, Т. Хоффман-Остенхофа и А. Лаптева, Ж. Тидблома.

В параграфе §2.1 рассматриваются неравенства для функций, заданных на отрезке числовой прямой, приводятся вспомогательные утверждения и необходимые определения. Одномерные неравенства используются нами для доказательства многомерных аналогов неравенств.

Верна следующая теорема.

Теорема 2.1.1. Пусть $u \in C_0^{\infty}(a,b)$. Тогда при $p \ge s > 1$ имеем

$$\int_a^b \frac{|u'(t)|^p}{\rho(t)^{s-p}} dt \ge \left(\frac{s-1}{p}\right)^p \left(\int_a^b \frac{|u(t)|^p}{\rho^s(t)} dt - \frac{p-1}{\left(\frac{b-a}{2}\right)^s} \int_a^b |u(t)|^p dt\right),$$

e

$$\rho(t) = dist(t, \mathbb{R} \setminus [a, b]) = \min(t - a, b - t).$$

В параграфе §2.2 получен аналог неравенства теоремы 2.1.1 в многомерном случае. В доказанных неравенствах используются весовые функции, зависящие от расстояния по направлению.

Пусть Ω — открытая область в \mathbb{R}^n . Следуя Е.Б. Дэвису, обозначим через $\tau_{\nu}(x)$ — расстояние между точкой $x \in \Omega$ и ближайшей точкой, принадлежащей границе $\partial\Omega$ по направлению вектора $\nu \in \mathbb{S}^{n-1}$:

$$\tau_{\nu}(x) = \min\{s > 0 : x + s\nu \in \Omega\}.$$

Определим также расстояние до границы множества ρ_{ν} и диаметр множества D_{ν} вдоль направления ν следующим образом:

$$\rho_{\nu}(x) = \min\{\tau_{-\nu}(x), \tau_{\nu}(x)\}, \ D_{\nu}(x) = \tau_{\nu}(x) + \tau_{-\nu}(x).$$

Пусть

$$\delta(x) = \inf_{\nu \in \mathbb{S}^{n-1}} \tau_{\nu}(x) = \operatorname{dist}(x, \partial \Omega),$$

$$\Omega_{x} = \{ y \in \Omega : x + t(y - x) \in \Omega, \forall t \in [0, 1] \}.$$

При вышеприведенных обозначениях верна следующая теорема.

Теорема 2.2.1. Для произвольной открытой области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и произвольной функции $u \in C_0^\infty(\Omega)$ при $p \geq s > 1$ верно следующее неравенство типа Xар ∂u :

$$\int_{\Omega} |\nabla u(x)|^p \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{|\cos(\nu, \nabla u(x))|^p}{\rho_{\nu}^{s-p}(x)} d\omega(\nu) dx \ge
\ge a(p,s) \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{d\omega(\nu)}{\rho_{\nu}^{s}(x)} dx + (p-1) \left(\frac{|\mathbb{S}^{n-1}|}{n} \right)^{\frac{s}{n}} \int_{\Omega} \frac{|u(x)|^p}{|\Omega_x|^{s/n}} dx \right).$$

e

$$a(p,s) = \left(\frac{s-1}{p}\right)^p.$$

В §2.3 показывается, что в случае выпуклой области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ неравенство теоремы 2.2.1 может быть существенно упрощено. В параграфе §2.4 представлен специальный класс невыпуклых областей, для которых существуют аналоги неравенства теоремы 2.2.1.

Следуя Е.Б. Дэвису определим псевдодистанцию m(x) от точки x до границы области Ω :

$$\frac{1}{m^2(x)} := \frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \frac{d\mathbb{S}^{n-1}(\nu)}{\tau_{\nu}^2(x)} .$$

Введем понятие регулярной области в пространстве \mathbb{R}^n . Будем говорить, что область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — регулярная область, если существует конечная константа c>0 такая, что

$$\delta(x) \le m(x) \le c\delta(x) \quad \forall x \in \Omega.$$

Константу c назовем константой регулярности области Ω .

Теорема 2.4.1. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — произвольная регулярная область с константой регулярности $c, u \in C_0^\infty(\Omega)$ — произвольная функция. Тогда при $p \geq s > 1$ справедливо неравенство

$$\int_{\Omega} \frac{|\nabla u(x)|^p}{\delta^s(x)} dx \ge K_2 \int_{\Omega} \frac{|u(x)|^p}{\delta^s(x)} dx + K_3 \int_{\Omega} |u(x)|^p dx,$$

где

$$K_{3} = \frac{a(p,s)2^{s/2}}{c^{s}} \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{n+p}{2}\right)}{D_{p}(\Omega) \Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)},$$

$$K_{4} = a(p,s)(p-1) \left(\frac{|\mathbb{S}^{n-1}|}{n|\Omega|}\right)^{\frac{s}{n}} \frac{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{n+p}{2}\right)}{D_{p}(\Omega) \Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$

u

$$D_p(\Omega) := \sup_{\nu \in \mathbb{S}^{n-1}} \rho_{\nu}^p(x), \ x \in \Omega,$$

 $\Gamma(x)$ — гамма функция Эйлера.

Параграф §2.5 посвящен неравенствам в регулярных областях с весами, имеющими логарифмические множители. Сначала доказываются вспомогательные утверждения и вводятся необходимые обозначения.

Для целых $i \geq 0$ положим

$$e_0 = 0$$
, $e_1 = 1$, $e_{i+1} = \exp e_i$, $\ln_0 x = x$, $\ln_{i+1} x = \ln(\ln_i x)$.

Определим функции φ_i при целых $k \geq 0$ следующим образом

$$\varphi_i(x, e_k) = \frac{1}{(e_k - \ln x) \ln(e_k - \ln x) \cdot \ldots \cdot \ln_i(e_k - \ln x)}, \ i \le k.$$

Отметим, что корректная определенность областей определения функций \ln_i и φ_i при соответствующих i и k достигается за счет e_k .

Имеют место следующие теоремы.

Теорема 2.5.1. Для произвольной открытой области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и произвольной функции $u \in C_0^{\infty}(\Omega)$ при целом $k \geq 0$ верно следующее неравенство типа Харди:

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - K_5 \int_{\Omega} \frac{|u(x)|^2}{|\Omega_x|^{2/n}} dx \ge
\ge \frac{n}{4} \int_{\Omega} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \left(\frac{1}{\rho_{\nu}^2(x)} + \sum_{i=0}^k \frac{\varphi_i^2(\frac{\alpha \rho_{\nu}(x)}{D}, e_k)}{\rho_{\nu}^2(x)} \right) d\omega(\nu) |u(x)|^2 dx +$$

где

$$K_5 = \left(1 - \sum_{i=0}^k \varphi_i^2\left(\frac{\alpha}{2}, e_k\right)\right)^2 \frac{n^{(n-2)/2}}{4} s_{n-1}^{2/n}.$$

Теорема 2.5.2. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — регулярная область с константой регулярности с и $0 < \alpha \leq 2$. Тогда для произвольной функции $u \in C_0^\infty(\Omega)$ при целом $k \geq 0$ верно неравенство

$$\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx - K_6 \int_{\Omega} |u(x)|^2 dx \ge
\ge \frac{n}{2c^2} \int_{\Omega} \frac{|u(x)|^2}{\delta^2(x)} \left(1 + \sum_{i=0}^k \varphi_0^2 \left(\frac{\alpha \delta}{D}, e_k \right) \cdot \dots \cdot \varphi_i^2 \left(\frac{\alpha \delta}{D}, e_k \right) \right) dx,$$

где

$$K_6 = \left(1 - \sum_{i=0}^{k} \varphi_0\left(\frac{\alpha}{2}, e_k\right) \cdot \ldots \cdot \varphi_i\left(\frac{\alpha}{2}, e_k\right)\right)^2 \frac{n^{(n-2)/2}}{4} s_{n-1}^{2/n} \frac{1}{|\Omega|^{2/n}}.$$

Третья глава посвящена аналогам неравенств, полученных Ю.А. Дубинским. Особенностью результатов является наличие модуля логарифма в весовых функциях.

В параграфе §3.1 первой главы приводятся вспомогательные результаты и доказываются одномерные неравенства. Отметим, что мы используем подход Ю.А. Дубинского при доказательстве соответствующих утверждений.

Пусть R произвольное положительное число и положим, что

$$F(r) = \begin{cases} \int_{r}^{R} f(t)dt \text{ при} & r \in (0, R), \\ \int_{r}^{r} f(t)dt \text{ при} & r \in (R, \infty). \end{cases}$$

Тогда верна следующая

Теорема 3.1.1. Пусть $p \in [1, \infty), \ l \in [1, p], \ 1 < s < p + 1 \ u \ f : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ — локально интегрируемая функция такая, что интеграл

$$\int_{0}^{\infty} |F(r)|^{p-l} |f(r)|^{l} r^{l-1} \left| \ln \frac{r}{R} \right|^{l-s} dr$$

сходится. Тогда для любого R>0 верно следующее неравенство

$$\int_{0}^{\infty} \frac{1}{r \left| \ln \frac{r}{R} \right|^{s}} |F(r)|^{p} dr \le \left(\frac{p}{s-1} \right)^{l} \int_{0}^{\infty} |F(r)|^{p-l} |f(r)|^{l} r^{l-1} \left| \ln \frac{r}{R} \right|^{l-s} dr.$$

Оказывается неравенство теоремы 3.1.1 будет верным не только в интервале $(0,\infty)$, но и также в интервале $(r_0,R_0)\subset (0,\infty)$. Этот результат приведен в **теореме 3.1.2.**

В **теореме 3.2.1** получен аналог неравенства теоремы 3.1.1 с другим ядром интеграла и при определении подинтегральной функции F использован весовой множитель.

В параграфе §3.2 доказываются неравенства, веса которых содержат вложенные логарифмы и экспоненты.

Параграф §3.3 посвящен неравенствам в многомерном случае. В последнем параграфе §3.4 третьей главы устанавливается точность констант в неравенствах теорем 3.1.1 и 3.2.1.

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации основных результатов исследования

- [1] Авхадиев, Ф.Г. Неравенства типа Харди со степенными и логарифмическими весами в областях евклидова пространства / Ф.Г. Авхадиев, Р.Г. Насибуллин, И.К. Шафигуллин // Известия вузов. Матем. 2011. № 9. С. 90–94.
- [2] Насибуллин, Р.Г. *Неравенства типа Харди с логарифмическими и степенными весами для специального семейства невыпуклых областей* / Р.Г. Насибуллин, А.М. Тухватуллина // Уфимский математический журнал. − 2013. Т. 5. №2. С. 43–55.

Статьи в сборниках научных трудов и тезисов докладов на научно - практических конференциях

- [3] Насибуллин, Р.Г. *Неравенства типа Харди, включающие повторные логарифмы* / Р.Г. Насибуллин // Тр. Матем. центра им. Н.И. Лобачевского. Казань: Изд-во Казан. матем. об-ва. 2011. Т. 43. С. 262–263.
- [4] Насибуллин, Р.Г. *Неравенства типа Харди с логарифмическими особенностями в ядре* / Р.Г. Насибуллин // Сборник научных трудов победителей всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в области математических наук в рамках Всероссийского фестиваля науки. М.: Изд-во РГСУ. 2011. С. 199–209.
- [5] Авхадиев, Ф.Г. *Неравенства типа Харди в областях с ограниченным внутренним радиусом* / Ф.Г. Авхадиев, Р.Г. Насибуллин // Тр. Матем. центра им. Н.И. Лобачевского. Казань: Изд-во Казан. матем. об-ва. 2012. Т. 45. С. 3–4.
- [6] Насибуллин, Р.Г. O точности двух констант в неравенствах типа Xарди / Р.Г. Насибуллин // Тр. Матем. центра им. Н.И. Лобачевского. Казань: Изд-во Казан. матем. об-ва. 2013. Т. 46. С. 331–333.
- [7] Насибуллин, Р.Г. Логарифмические особенности в неравенствах типа $Xap\partial u$ / Р.Г. Насибуллин // Сборник материалов Открытого конкурса научных работ студентов и аспирантов им. Н.И. Лобачевского Казань: Изд-во: Научный Издательский Дом. 2012. С. 78–79.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ

В диссертационной работе получены новые неравенства типа Харди с весами, имеющими степенные и логарифмические особенности. Доказаны неравенства в одномерном случае и получены их многомерные аналоги. Рассмотрены соответствующие неравенства в произвольных и выпуклых областях, в областях регулярных по Е.Б. Дэвису, во всем евклидовом пространстве \mathbb{R}^n . Показана точность некоторых констант. Соответствующие результаты обобщают утверждения Ф.Г. Авхадиева, М. Хоффман-Остенхоф, Т. Хоффман-Остенхофа и А. Лаптева, Дж. Тидблома и Ю.А. Дубинского. Полученные неравенства могут послужить некоторым инструментом для дальнейших теоретических исследований в теории краевых задач для вырождающихся дифференциальных уравнений.

В заключение автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю Авхадиеву Фариту Габидиновичу за всяческую поддержку, за ценные советы, критические замечания и постоянное внимание к работе.